AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS — TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL 60 F.
C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 114 (13/78) 24 MAI 1978

VIGNE

MILDIOU :

A la faveur des pluies orageuses, quelques contaminations ont pu ou peuvent se produire. Des sorties de taches sont donc possibles à la fin du mois. En conséquence, si aucun traitement contre le mildiou n'a été réalisé à cette date ou en cas de lessivage important, il convient de réaliser la protection lorsque la végétation est suffisamment avancée? Nous rappelons qu'une pluie de 20 mm est suffisante pour lessiver un traitement.

OIDIUM : Dans les parcelles sensibles, on adjoindra au traitement mildiou, un soufre mouillable ou, si le temps le permet, un soufre poudrage actif également contre les acariens.

ESCARGOTS : Des dégâts importants d'escargots sont signalés. Il n'existe que peu de références en la matière, mais il est possible qu'une pulvérisation de mercaptodiméthur (Mesurol 50) produit insecticide-acaricide et molluscicide puisse avoir une action intéressante contre ces ravageurs.

POMMIERS - POIRIERS

TAVELURE : Sauf lessivage important, le traitement conseillé dans notre précédent bulletin assure la protection.

CEREALES

SEPTORIOSE et FUSARIOSE sur BLES :

A part quelques situations plus favorables (ex. terres de Champagne dans les Charentes). Septoriose et fusariose sont à craindre dans toute la région. Les conditions climatiques de l'année incitent donc à faire un traitement fongicide dès le début de l'épiaison. Par contre, et contrairement à l'année passée, la rouille brune est rarement menaçante. Pour le choix des produits, se reporter au bulletin n° 113, ou aux journaux agricoles du 19 Mai.

ROUILLE JAUNE (Département de la Vienne)

Les attaques de cette maladie très grave sont localisées à la zone limitrophe de l'Indre-et-Loire , (Loudunais, Châtelleraudais). Jusqu'à présent, seules les variétés très sensibles sont attaquées : Comtal, Lutin (et sans doute Ducat). Mais à proximité de ces foyers , d'autres variétés, réputées plus résistantes, peuvent aussi être contaminées (Talent, Top, Capitole), comme c'est le cas dans la région voisine "Centre".

Nous rappelons que le traitement doit être fait dès la détection des premiers symptômes dans la parcelle. De plus, les traitements réalisés il y a deux semaines doivent être renouvelés.

Pour le choix des produits, se reporter au précédent bulletin, nous précisons en outre que Rendor est homologué contre la rouille jaune et peut être utilisé en complémentation d'un produit actif sur septoriose et fusariose.

Imprimerie de la Station Poitou-Charentes - Directeur Gérant : P. JOURNET

.../...

TABAC

MILDIOU : Il est rappelé aux planteurs de tabac l'obligation légale qui leur est faite, afin de lutter préventivement contre cette maladie de traiter régulièrement leurs semis jusqu'au moment de leur destruction, de détruire les semis malades par application d'une solution de formol à 5 % à raison de 20 l. pour 10m2 avec couverture par un film plastique, de ne repiquer que du plant indemne de mildiou et de détruire complètement les semis dès la fin de la transplantation et au plus tard avant le 9 Juillet. Tout foyer de mildiou doit être signalé immédiatement au Service de la Protection des Végétaux, ou au SEITA.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Poitou-Charentes"

R. GUILLEMENET

Imprimé à la Station le 24 Mai 1878 - Précédente Note : Bulletin n° 113 - 18.5.78

N° de papier de presse : 535 AD